

ACTIVIDADES ONLINE 2020



RESPUESTAS DE LOS TESTS Y CASOS RADIOLÓGICOS

Protocolos Abreviados RM

Señala la respuesta correcta acerca de los protocolos abreviados de RM
No deben sacrificar sensibilidad y exactitud diagnóstica.

Sobre las estrategias para ganar tiempo en los estudios de RM, señala la respuesta falsa
No existe tecnología con suficiente resolución temporal para poder realizar estudios dinámicos con múltiples adquisiciones en fase arterial

Acerca de los escenarios clínicos de los protocolos abreviados en RM abdominal
Son ciertas a, b y d

Nefroprotección

¿Cuál es el dintel de profilaxis que recomienda la ESUR para inyección de contraste por vía endovenosa?
30mL/min

¿Cuál de estas pautas de nefroprotección es la más efectiva para paliar la lesión renal aguda postcontraste?
Hidratación

¿Cuándo debe dejarse de tomar la medicación habitual del paciente antes de la realización de una tomografía computarizada con contraste?
0 horas antes

¿En qué pacientes debe realizarse profilaxis antes de la inyección de contraste endovenoso?
Paciente en diálisis peritoneal con diuresis residual

¿Cuál de estos supuestos contraindica la hidratación?
Que el médico le haya restringido los líquidos

ACTIVIDADES ONLINE 2020



Urgencias abdominales en pacientes oncológicos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

La quimioterapia y otros fármacos anticancerígenos no se asocian con el desarrollo de eventos tromboembólicos

Con los datos clínicos disponibles y las imágenes radiológicas, ¿cuál es el diagnóstico?

Isquemia intestinal con neumatosis y gas porto-mesentérico

Lesiones Hipervasculares Hepáticas

Marca la opción correcta

Son lesiones sospechosas con intensidad moderada en T2 y restricción de la difusión

¿Cuál es la opción correcta?

Son lesiones hipervasculares, realzan en fase arterial de forma intensa

En este paciente...

El diagnóstico de sospecha ante la discordancia radio-histológica y la presencia de metástasis hipervasculares con lesión retroperitoneal es de tumoración neuroendocrina

Las metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos...

Todas son correctas

Complicaciones del Bypass Gástrico

¿Qué complicación postquirúrgica sospechas?

Dehiscencia anastomótica

¿Dónde sospechas que se localiza esta complicación?

Anastomosis gastro-yeyunal

¿Cuál consideras que sería el tratamiento de elección?

Tratamiento conservador

Tras visualizar las imágenes del TGI realizado el 40º día postoperatorio, ¿consideras que existe resolución de la complicación?

No

ACTIVIDADES ONLINE 2020



Lesión Quística Pancreática

Ante esta lesión incidental en una mujer de 52 años, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el menos probable?

Pseudoquiste

¿Cuál es el siguiente paso?

Ultrasonografía endoscópica con punción

El análisis del líquido corresponde a una muestra acelular, con CEA 200 ng/ml, KRAS +, GNAS - .

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Neoplasia quística mucinosa

Ante este diagnóstico de presunción. ¿Cuál de las siguientes no es una opción aceptable?

No hacer nada

Cálculo del Índice de Carcinomatosis Peritoneal

¿Cuáles son las regiones predictoras de citorreducción incompleta?

R1, R2, R6, y regiones intestinales

¿Es necesario utilizar contraste oral en los estudios de valoración del ICP?

Es imprescindible, excepto en pacientes con oclusión intestinal

Señala la afirmación falsa:

La cuantificación por imagen del ICP tiene una precisión del 100%

Los depósitos tumorales se extienden a todas estas estructuras, excepto:

Parénquima hepático

Fístulas perianales, ¿qué aportar?

¿Cuál sería la localización anatómica de la fístula según la clasificación de Parks?

Transesfintérica

¿Cuál sería el contenido de la fístula?

Tejido de granulación

¿Existe alguna extensión o trayecto secundario?

Sí, hacia el espacio infraelevador

ACTIVIDADES ONLINE 2020



¿Existe alguna extensión o trayecto secundario?

Sí, hacia el espacio infraelevador

¿Existe alguna colección o flemón?

No

Pitfalls en RM de próstata

¿Qué se ve en la imagen?

Se ve un nódulo PI-RADS 4 en la ZP derecha

Tumores retroperitoneales para Dummies

En la imagen que aparece en los recursos de la sesión se muestra una TC de abdomen con contraste intravenoso de una mujer de mediana edad. La masa de la imagen es:

Retroperitoneal

La masa le parece:

Retroperitoneal porque desplaza el colon descendente anteriormente

¿De cuál de los siguientes espacios NO le parece que depende la masa?

Pararenal posterior

¿Cuál de los siguientes espacios no se continúa con el espacio pélvico extraperitoneal?

Perirenal